



Κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ

- Διασφαλίστε υψηλής ποιότητας θωρακικές συμπίεσεις
- Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές στις συμπίεσεις
- Χορηγήστε οξυγόνο
- Χρησιμοποιήστε καπνογράφο με κυματομορφή
- Αδιάλειπτες θωρακικές συμπίεσεις όταν τοποθετηθεί εξειδικευμένος αεραγωγός
- Αγγειακή πρόσβαση (ενδοφλέβια ή ενδοοστική)
- Χορηγήστε Αδρεναλίνη κάθε 3-5 λεπτά
- Χορηγήστε Αμιωδαρόνη έπειτα από 3 απινιδώσεις

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

- | | |
|---|------------------------------------|
| Υποξία | Θρόμβωση - στεφανιαία ή πνευμονική |
| Υποογκαιμία | Υπο τάση Πνευμοθώρακας |
| Υπο-/Υπερκαλιαιμία/Μεταβολικές Διαταραχές | Καρδιακός Επιπωματισμός |
| Υποθερμία/ Υπερθερμία | Τοξίνες |

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ

- Απεικόνιση με υπερηχογράφο
- Μηχανικές θωρακικές συμπίεσεις για διευκόλυνση μεταφοράς/θεραπείας
- Στεφανιαία αγγειογραφία και Διαδερμική Στεφανιαία παρέμβαση
- ΚΑΡΠΑ με τη χρήση Εξωσωματικής Κυκλοφορίας